



Prüfergebnis

Akute Bientoxizität nach Oraler Applikation oder Kontakt-Applikation an der Honigbiene (*Apis mellifera* L.)

LIXUM^{PRO} Beutenschutz-Lasur

LIXUM^{PRO} Beutenschutz-Lasur wurde nach den Richtlinien OECD No. 213 (Oraler Test; 1998) und OECD No. 214 (Kontakt-Test; 1998) [Richtlinien zur Prüfung von Chemikalien auf die akute Bientoxizität] geprüft.

BioChem Projekt Nr.:	19 48 BAA 0007
Auftraggeber:	FloraPren GmbH Clara-Zetkin-Str. 32 07545 Gera, Deutschland
Prüfeinrichtung:	BioChem agrار, Labor für biologische und chemische Analytik GmbH, Kupferstr. 6, 04827 Machern OT Gerichshain, Deutschland
Test Spezies:	Honigbiene [<i>Apis mellifera</i> L. (<i>iberiensis</i> E.)]

Ergebnis

LIXUM^{PRO} Beutenschutz-Lasur zeigte nach oraler Applikation oder Kontakapplikation keine Effekte auf die Mortalität von Bienen und deren Verhalten im Vergleich zur Kontrolle.

In dieser Prüfung zeigte LIXUM^{PRO} Beutenschutz-Lasur in den getesteten Raten keine Toxizität gegenüber der Honigbiene.

07 Januar 2019

Monique Franke

Markus Barth